

PRODUCTO:	DICOL.	Nº Registro: 03808 - H
REVISIÓN (aammdd):	180530	

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

DESCRIPCIÓN	<p>Pre-diluyente aséptico desinfectante del eyaculado de porcino, destinado a la extracción y saneamiento de los eyaculados de porcino previamente a la dilución final.</p> <p>Compatible con los diluyentes de conservación habituales de semen porcino in vitro a 15-17°C, tanto para los diluyentes de corta como de media, larga y extra larga duración, dependiendo de la calidad del eyaculado de partida, manteniéndose los parámetros físico-químicos (pH, osmolalidad) y de funcionalidad espermática del mismo.</p> <p>Producto de uso en el ámbito de la Inseminación Artificial Porcina.</p>
PRESENTACIÓN	
APLICACIONES	<p>Diluir el contenido del envase en 1 litro de agua bi-destilada o destilada o en su defecto agua de laboratorio de calidad tipo II a una temperatura de 37°C agitando la disolución para favorecer la misma. Una vez reconstituido el pre-diluyente usar 150 ml del mismo en termo a 37°C para la recogida del eyaculado.</p>

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

DC 16

Edic.: 02



ESPECIFICACIONES:

PRESENTACIÓN FARMACEÚTICA	
	Forma Física: polvo blanco inodoro. Características de embalaje: Material complejo tricapa PET-AL-PE termosellado con formato para diluir en: 1 Litro. Sistema de sellado: termosellado.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA	
	Glucosa. Bicarbonato Sódico. Estabilizadores de membrana. Excipientes. Contiene antibióticos según la Directiva Europea 90/429/EEC.
MODO DE FABRICACIÓN	
	DICOL de MAGAPOR se fabrica con productos químicos de calidad farmacéutica o en su defecto calidad alimentaria. Durante el procedimiento de elaboración no existe ningún proceso térmico, dado que se trata de materias primas puras sintetizadas químicamente, procedentes de la industria química o alimentaria, sin ninguna posibilidad de vehicular agentes infecciosos. Este producto no contiene ninguna proteína de origen animal, encontrándose libre por tanto de B.S.A. (seroalbúmina bovina) evitando así la transmisión de potenciales patógenos.
OTROS	
VIA DE ADMINISTRACIÓN	No aplicable (No inyectar. No ingerir).
CONSERVACIÓN MÁXIMA TRAS RECONSTITUCIÓN	2-3 días - Conservar en nevera entre 2°C y 8°C, comprobando siempre que el producto este cerrado herméticamente, protegido del aire y de posibles agentes externos.
POSIBLES EFECTOS COLATERALES (LOCALES Y/O GENERALES, INCOMPATIBILIDAD Y ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS):	Ninguno.

EP.SD.131

XX - Departamento vinculado (A: Almacén, SD: Diluyentes, TE: Taller, B: Bolsas)

YY - Número correlativo, unívoco e inequívoco

Página 2 de 3

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO**DC 16****Edic.: 02**

INTOXICACIÓN Y SOBREDOSIFICACIÓN EN LOS ANIMALES:	No aplicable.
INTOXICACIÓN EN EL HOMBRE:	No ingerir. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
EFFECTOS BIOLÓGICOS NO DESEADOS:	No aplicable.
CONTROL SOBRE RESIDUOS MEDICAMENTOSOS:	No aplicable.
CONSERVACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO:	Almacenar en ambiente seco y fresco, al abrigo del sol y de la humedad.

FECHA DE CONSUMO PREFERENTE	
	24 MESES desde la fecha de fabricación (ver envase la fecha de consumo preferente).